

## PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

### MEBENDAZOLE-GRINDEKS, 100 mg tabletid

Mebendasool

#### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

#### Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Mebendazole-Grindeks ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Mebendazole-Grindeks'i kasutamist
3. Kuidas Mebendazole-Grindeks'it kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Mebendazole-Grindeks'i säilitamine
6. Lisainfo

### 1. MIS RAVIM ON MEBENDAZOLE-GRINDEKS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Mebendazole-Grindeks on laia toimespektriga anthelmintikum (sooleussidevastane preparaat), mille toimeaineks on mebendasool. Ravimit kasutatakse erinevate parasiitusside poolt tekitatud haiguste raviks (enterobiaas e naaskelsabatõbi, trihhuriaas e piuglastõbi, askaridoos e solkmed, kidausside ja ümarusside poolt põhjustatud infektsioonid).

### 2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE MEBENDAZOLE-GRINDEKS'I KASUTAMIST

#### Ärge kasutage Mebendazole-Grindeks'it

- kui te olete allergiline ( ülitundlik) mebendasooli või ravimi mõne koostisosa suhtes.

#### Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Mebendazole-Grindeks

- vältimaks taasnakatamist peab patsient jälgima arsti poolt soovitatud puhtusenõudeid.
- kui te olete põdenud maksahaigusi, rääkige sellest arstile.
- mebendasooli ei määrata alla 2-aastastele lastele.

#### Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui kasutatakse tavalisi annuseid ega ületata ravikuuri pikkust, siis koostoimeid teiste ravimitega praktiliselt ei esine.

Pikaaegne ravi koos tsimetidiiniga (mao ülihappesuse ravim) võib soodustada mebendasooli kuhjumist organismis.

Mebendasooli ja metronidasooli (teatud põletike vastane ravim) koostarvitamist tuleb vältida.

**Kasutamine koos toidu ja joogiga**

Rasvane toit võib suurendada mebendasooli imendumist.

**Rasedus ja imetamine**

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Mebendazole-Grindeks'it ei tohi raseduse ajal kasutada ilma vältimatu vajaduseta..

Ravimi eritumisest rinnapiima on andmeid vähe, seetõttu tuleb olla rinnaga toitmise ajal mebendasooli manustamisega ettevaatlik.

**Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Mebendasool ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

**Oluline teave mõningate Mebendazole-Grindeks koostisainete suhtes**

Mebendazole-Grindeks sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust arstiga.

**3. KUIDAS MEBENDAZOLE-GRINDEKS'IT KASUTADA**

Kasutage Mebendazole-Grindeks'it alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit manustatakse suu kaudu.

- Annus sõltub nakkuse liigist.
- Lastele manustamisel tuleb tablett eelnevalt peenestada. Kontrollige alati lapse ravimi manustamist.
- Tabletti võib alla neelata tervelt või katkinärituna.
- Puudub vajadus kasutada lahtisteid või muuta toitumist.

Lastel ja täiskasvanutel on sama annustamisskeem.

Naaskelsabade e enterobiaasi raviks manustatakse üks tablett (100 mg) ühekordse annusena.

Sooleparasiitnakkuse puhul antakse 1 tablett (100 mg) kaks korda päevas (hommikul ja õhtul) kolmel järjestikusel päeval või vastavalt arsti juhistele.

Taasnakatamise kahtluse korral võib ravi korrata 3 nädala pärast.

Mebendasooli alla 2-aastastel lastel ei kasutata.

Konsulterige arstiga kui haiguse sümptomid ikkagi püsivad.

Mitte ületada määratud annust ja ravikuuri pikkust.

**Kui te kasutate Mebendazole-Grindeks'it rohkem kui ette nähtud**

Üleannustamisel võivad esineda seedetraktihäired nagu kõhuvalu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Üleannustamise korral võtke koheselt ühendust arstiga.

**Kui te unustate Mebendazole-Grindeks'it kasutada**

Võtke järgmine annus niipea, kui see teile meenub. Juhul kui läheneb järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus vahele. Seejärel jätkake nii nagu ette kirjutatud. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

**4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Mebendazole-Grindeks'i kasutamine ja võtke koheselt ühendust oma arstiga kui teil tekivad või kui te kahtlustate endal alljärgnevat kõrvaltoimeid. Te võite vajada kiiret ravi.

Väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st):

- äkiline näo või kõri turse, lööve (tuntud kui nõgestõbi või urtikaaria), tugev nahaärritus, -punetus või vill-lööve. Need võivad olla raske allergilise reaktsiooni tunnusteks;
- vill-lööve nahal, suus, silmades ja genitaalidel;
- krambid lastel.

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga kui te märkate endal alljärgnevat kõrvaltoimeid:

Väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st):

- lööve ja nõrk sügelus,
- kõhuvalu või kõhulahtisus.

Muud kõrvaltoimed:

- neeru- või maksapõletik,
- maksaensüümide muutused (nähtavad vereanalüüside näituses),
- vere valgeliblede arvu vähenemine (nähtavad vereanalüüside näituses). Põletike tekke oht.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

## 5. MEBENDAZOLE -GRINDEKS'I SÄILITAMINE

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Mebendazole-Grindeks'it pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## 6. LISAINFO

**Mida Mebendazole-Grindeks sisaldab**

- Toimeaine on mebendasool (*Mebendazolium*).

Iga tablett sisaldab 100 mg mebendasooli.

- Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon K29/32, naatriumglükolaattärklis tüüp A, magneesiumstearaat, värvaine Sunset Yellow Lake (E 110).

**Kuidas Mebendazole-Grindeks välja näeb ja pakendi sisu**

Ümmargused, lamedad, valgete ja tumeroosade täppidega roosad, poolitusjoonega tabletid.

6 tabletti blisrepakendis; 1 blisterpakend pappkarbis.

**Müügiloa hoidja ja tootja**

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti

Tel.: +371 67083205

Faks: +371 67083505

e-mail: grindeks@grindeks.lv

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal  
Tondi 33,11316 Tallinn  
Tel.: 612 02 24

Infoleht on viimati koostöölstatud aprillis 2011