

Gripp-Heel tabletid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis preparaat on Gripp-Heel ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Gripp-Heel'i kasutamist.
3. Kuidas Gripp-Heel'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Gripp-Heel'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS RAVIM ON GRIPP-HEEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Gripp-Heel on homöopaatiline preparaat.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE GRIPP-HEEL'i KASUTAMIST

Ärge võtke Gripp-Heeli, kui olete allergiline või ülitundlik Gripp-Heel'i mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

Muud ravimid ja Gripp-Heel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Gripp-Heel'i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

Gripp- Heel sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS GRIPP-HEEL'i KASUTADA

Võtke Gripp-Heel'i alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on Teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitav annus on:

Tavaline annus on 1 tablett 3-5 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni. Haiguse algstaadiumis võib võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Kui teil on tunne, et Gripp-Heeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Gripp-Heeli rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teavitatud.

Kui te unustate Gripp-heeli võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Gripp-heeli võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Gripp-Heel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva (esinevad vähem kui 1 patsiendil 10000-st) võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. KUIDAS GRIPP-HEEL'i SÄILITADA

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Gripp-Heel'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Gripp-Heel sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

1.	<i>Aconitum napellus</i>	D4	120 mg
2.	<i>Bryonia</i>	D4	60 mg
3.	<i>Lachesis</i>	D12	60 mg
4.	<i>Eupatorium perfoliatum</i>	D3	30 mg
5.	<i>Phosphorus</i>	D5	30 mg

Abiained:

1. magneesiumstearaat 1,5 mg
2. laktoosmonohüdraat 300mg

Kuidas Gripp-Heel välja näeb ja pakendi sisu

Pappkarp, milles plastpurg 50 või 250 tabletiga.

Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga, kohati on nähtavad mustad või kollased laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-135

Faks. +49 7221 501 440

E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS

Võru tn 11

13612 Tallinn

Eesti

Tel. +372 - 6328 830

e-mail: info@aconit.ee

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014